

Cannava CBD 10

Cannabidiol

POSOLOGÍA

**La dosis terapéutica es individual
y requiere titulación**

Pautas generales de titulación:

Iniciar con		Efecto terapéutico		Conducta	
Dosis baja	>	Sin efecto	>	Aumentar dosis	>
Dosis baja	>	Control sintomático	>	Mantener dosis	>
Dosis baja	>	Efecto adverso	>	Regresar a dosis previa	>

DOSIFICACIÓN EN EPILEPSIA REFRACTARIA:

Inicio con **2.5mg/k** cada 12 hs
Incrementar **5mg/k** cada 7 días
Distribuir dosis cada 12 hs
Dosis máxima: **10-20mg/k/día**

DOSIFICACIÓN EN OTRAS INDICACIONES:

Inicio con **3mg/día** o cada 12 hs
Incrementar **3mg/día** cada 3 - 5 días
Distribuir dosis cada 24,12 u 8 hs
Dosis máxima: **40mg/día**

**Venta exclusiva en farmacia
bajo receta médica**



cannava
SOCIEDAD DEL ESTADO

GOBIERNO DE
JUJUY
el norte a seguir

 Argentina

ÚNICA PRESENTACIÓN

- Cannabidiol 100 mg/ ml
- Solución oral
- 1 gota = 0,03 ml = 3mg de cannabidiol
- Fórmula cuali – cuantitativa:
- Cada ml de solución oral contiene:
- Cannabidiol 100 mg.

Excipientes:

- Saborizante de limón 100 mg.
- Aceíte de sésamo c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES

Cannabidiol es un fitocannabinoide no psicoactivo derivado de la planta de cannabis. Su acción es:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ● Anticonvulsivante | ● Miorelajante |
| ● Antiinflamatoria | ● Ansiolítica |
| ● Antioxidante | ● Antipsicótica |
| ● Neuroprotectora | ● Antibacteriana |

INDICADO COMO TERAPIA CO ADYUVANTE EN:

- | | |
|---|---|
| ● Epilepsia refractaria. | ● Alteraciones conductuales en trastornos del neurodesarrollo (trastornos del espectro autista, Alzheimer). |
| ● Enfermedad inflamatoria intestinal. | ● Síntomas de disfunción temporo mandibular (bruxismo). |
| ● Dolor crónico de tipo neuropático y somático. | |
| ● Trastornos de la calidad del sueño. | |
| ● Síntomas de ansiedad y estrés post traumático. | |
| ● Estados espásticos asociados a neuropatías crónicas (esclerosis múltiple, Parkinson). | |